



## Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer

### Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer

Wirkstoffe in 100 g Gel: D-Campher 0,986 g, Latschenkiefernöl 0,394 g

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach einigen Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer beachten?

### 1. Was ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer und wofür wird es angewendet?

Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer ist ein traditionelles Arzneimittel.

#### Anwendungsgebiet

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer beachten?

**Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen D-Campher, Latschenkiefernöl oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- außerdem soll Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer nicht auf geschädigter Haut, z. B. bei Verbrennungen, Sonnenbrand, Ekzemen, Entzündungen oder Infektionen der Haut und offenen Wunden oder bei Haut- und Kinderkrankheiten mit Hautausschlägen (Exanthem) sowie auf der Schleimhaut und am Auge angewendet werden;
- bei Patienten mit Keuchhusten, Asthma bronchiale und anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen;
- bei diabetischer Mikroangiopathie;
- bei peripherer venöser oder arterieller Insuffizienz;
- bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anwenden.

Beim Auftreten von Krankheitszeichen wie z. B. Hautveränderungen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Beschwerden, die länger als 3 Tage anhalten oder sich verschlimmern, sollte zur Abklärung der Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden.

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit einer Rötung oder einer Schwellung einhergehen, bei andauernden Beschwerden oder bei heftigen Schmerzen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

3. Wie ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Lesen Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer vollständig einziehen und verwenden Sie keine Umschläge, Verbände oder Abdeckungen. Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich.

Nicht im Bereich der Augen auftragen, der Kontakt von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer mit Augen und Schleimhäuten sowie offenen Wunden sollte vermieden werden. Nach dem Auftragen von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer sollen die Hände gründlich gereinigt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Kinder mit ihren Händen nicht mit den mit dem Arzneimittel eingeriebenen Hautpartien in Kontakt gelangen.

#### Kinder

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer soll deshalb bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer enthält Ethanol (Alkohol)

Dieses Arzneimittel enthält 51,3 g Alkohol (Ethanol) pro 100 g Gel entsprechend 51,3 % (w/w).

Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen.

#### Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer enthält Rosmarinöl und Pfefferminzöl

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Rosmarinöl und Pfefferminzöl Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.

#### Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer enthält Duftstoffe mit Allergenen

Dieses Arzneimittel enthält Duftstoffe mit Citral, Linalool, Geraniol und D-Limonen. Citral, Linalool, Geraniol und D-Limonen können allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Aus Sicherheitsgründen nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.

## Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### 3. Wie ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### Dosierung

Bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren soll 1- bis 3-mal täglich ein ca. 2 - 3 cm langer Gelstrang Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer angewendet werden. Die Anwendung des Präparates sollte nicht unter abschließenden Verbänden und nicht gleichzeitig mit Wärmeanwendung erfolgen.

#### Art der Anwendung

Tragen Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer auf die zu behandelnden Hautpartien auf.

#### Dauer der Anwendung

Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht begrenzt.

#### Wenn Sie eine größere Menge von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer angewendet haben, als Sie sollten

Bei Überschreitung der empfohlenen Dosierung bei der Anwendung auf der Haut sollte das Gel wieder entfernt und mit Wasser abgespült werden. Bei topischer Anwendung von wesentlich zu großen Mengen oder versehentlicher Einnahme von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer ist der Arzt zu benachrichtigen. Dieser kann entsprechend der Art und Schwere der Beschwerden über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Ein spezifisches Antidot existiert nicht. Auf keinen Fall sollten Milch oder alkoholische Getränke getrunken werden, da dies die Aufnahme von ätherischen Ölen fördern kann.

#### Wenn Sie die Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

#### Wenn Sie die Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer abbrechen

Bei Fortbestehen der Beschwerden befragen Sie Ihren Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei Jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10000 Behandelten
Sehr selten	weniger als 1 von 10000 Behandelten
Nicht bekannt	Häufigkeit auf der Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

- Häufig können lokale Hautreaktionen, wie z. B. Hautrötungen, Jucken, Brennen oder Hautausschlag auch mit Pustel- oder Quaddelbildung auftreten.
- Gelegentlich kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen bzw. lokalen allergischen Reaktionen (Kontaktdermatitis) kommen.
- In sehr seltenen Fällen können bei entsprechend veranlagten Patienten Atemwegsverengungen (Bronchospasmen) vorkommen.

- Das Einatmen von ätherischen Ölen kann in seltenen Fällen Hustenreiz auslösen.
- Durch den Alkoholgehalt kann es zur Austrocknung der behandelten Hautpartien kommen.

Wenn Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer großflächig auf die Haut aufgetragen und über einen längeren Zeitraum angewendet wird, ist das Auftreten von Nebenwirkungen, die ein bestimmtes Organsystem oder auch den gesamten Organismus betreffen, wie sie unter Umständen nach systemischer Anwendung Campher-haltiger Arzneimittel auftreten können, nicht auszuschließen. Beim Auftreten von Hautrötungen, -brennen oder -reizung sind die betroffenen Stellen gründlich mit Wasser abzuspülen.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion soll die Behandlung abgebrochen und Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer nicht nochmals angewendet werden.

D-Campher, Rosmarinöl und Pfefferminzöl können bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Wie ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der äußeren Umhüllung und dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Nach Anbruch ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer 1 Jahr haltbar.

### 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### Was Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer enthält

Die Wirkstoffe sind: 100 g Gel enthalten:  
D-Campher 0,986 g, Latschenkieferöl 0,394 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol 96 %, Citronenöl, Pfefferminzöl, Rosmarinöl, ätherisches Muskatöl, Trometamol, Carborer 980, gereinigtes Wasser, Natriumsulfat, Chiningelb (E 104), Patentblau V (E 131)

#### Inhalt der Packung

Originalpackungen mit 10 g, 15 g, 30 g, 50 g, 75 g, 100 g und 150 g Gel  
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

#### Pharmazeutische Unternehmer

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, Gereonsmühlengasse 1 - 11, 50670 Köln  
Divapharma GmbH, D-12274 Berlin

#### Hersteller

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Str. 41, D-12277 Berlin

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2023.**

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klosterfrau Kundenberatung:  
Tel.: 0800/1652-100 Fax: 0800/1652-700  
E-Mail: [dialog@klosterfrau-service.de](mailto:dialog@klosterfrau-service.de)